




Letničky

Sortiment



Menší druhy letniček

- ❖ výška: 5 - 30 cm
- ❖ využití: kobercové výsadby, ornamentální záhony, pokryvné rostliny, osázení hrobů, atd.
- ❖ výsadbový spon: 10 - 30 cm
- ❖ + (výhody): hustý a kompaktní porost, kontinuální kvetení
- ❖ - (nevýhody): náročnost na ošetřování

Ageratum houstonianum - nestařec

- ❖ č: *Asteraceae*
- ❖ nízká a vysoká forma
- ❖ barva květu: bílá, modrá,
modro-fialová
- ❖ výsev: II.



Begonia x semperflorens - begónie

- ❖ č: *Begoniaceae*
- ❖ kříženec mnoha druhů
- ❖ snáší polostín
- ❖ atraktivní barva listů (červená)
- ❖ květy červené, růžové, bílé
- ❖ výsev: I. - II.



Brachycome iberidifolia - všelicha

- ❖ č: *Asteraceae*
- ❖ barva květů: modrá, modro-fialová, bílá
- ❖ sušší místa, nesnáší vlhko
- ❖ výsev: IV.



Briza maxima - třeslice

- ❖ č. *Poaceae*
- ❖ vhodná k sušení
- ❖ pěstuje se i druh *Briza minor*




Convolvulus tricolor - svlačec

- ❖ č. *Convolvulaceae*
- ❖ poléhavý růst
- ❖ atraktivní květ, větší plochy
- ❖ přímý výsev v IV.




Dianthus chinensis - hvozdík

- ❖ č. *Caryophyllaceae*
- ❖ mnoho barevných forem
- ❖ živná půda, jinak nenáročný
- ❖ výsev v III.




Dorotheanthus bellidiformis - kosmatec

- ❖ č. *Mesembryanthemaceae*
- ❖ kobercová letnička
- ❖ snáší sucho
- ❖ výsev III – IV.



Echeveria

- ❖ č. *Crassulaceae*
- ❖ přízemní růžice listů
- ❖ sukulentní letnička
- ❖ výsev, častěji vegetativní množení



Gazania splendens - gazánie

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ nízké kompaktní rostliny
- ❖ květy se otevřou jen za slunce
- ❖ nejč. oranžová barva květu
- ❖ výsev v IV.



Impatiens waleriana - netýkavka

- ❖ č. *Balsaminaceae*
- ❖ snáší stín
- ❖ křehké stonky
- ❖ barvy květů: červené, růžové, bílé
- ❖ výsev v III.



Lobelia erinus - lobelka

- ❖ č. *Campanulaceae*
- ❖ nízká kobercová letnička
- ❖ hodí se i do nádob
- ❖ barva květu: modrá, bílá, růžová
- ❖ výsev v II.



Lobularia maritima - tařice

- ❖ č. *Brassicaceae*
- ❖ kobercová letnička
- ❖ barva květu: bílá, růžová, modrá (do fialové)
- ❖ výsev v III. (přímý v IV.)



Mimulus luteus - kejklířka

- ❖ č. *Phrymaceae*
- ❖ snáší polostín a vlhko
- ❖ barva květu: žlutá, oranžová
- ❖ výsev: IV.



Nemesia strumosa - hledíkovka

❖ č. *Plantaginaceae*

❖ kvete velmi ranně (konec června)

❖ výsev: III.




Petunia x hybrida - petúnie

- ❖ č. *Solanaceae*
- ❖ kříženec mnoha druhů
- ❖ celé barevné spektrum
- ❖ nesnáší vlhký průběh počasí
(plíseň šedá)
- ❖ výsev: II.



Salvia splendens - šalvěj

- ❖ č. *Lamiaceae*
- ❖ zářivé barvy (nejč. červená)
- ❖ plošné výsadby – plastická
- ❖ výsev: II.



Sanvitalia procumbens - vitálka

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ žluté, drobné květy
- ❖ kvete celé léto
- ❖ výsev: III.



Tagetes patula - aksamitník

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ kompaktní vzrůst, plošné výsadby
- ❖ extrémní stanoviště, plastická letnička
- ❖ pěstuje se ještě *T. tenuifolia*



Verbena x hybrida - sporýš

- ❖ č. *Verbenaceae*
- ❖ pokravná letnička
- ❖ velká barevná škála
- ❖ výsev: II. (nepravidelné vzcházení)
- ❖ *V. bonariensis* je vzrůstný druh - soliterní





Střední druhy letniček

- ❖ výška: 30 - 80 cm
- ❖ využití: letničkové záhony
- ❖ výsadbový spon: 20 - 50 cm
- ❖ + (výhody): dlouhodobé kvetení, velké druhové zastoupení (široký sortiment), výraznější skupiny
- ❖ - (nevýhody): kvetení není kontinuální, nekompaktní charakter růstu (mezerovitost)

Antirrhinum majus - hledík

- ❖ č: *Plantaginaceae*
- ❖ v domovině trvalka
- ❖ velká barevná škála
- ❖ výsev: III.



Calendula officinalis - měsíček

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ velmi stará letnička
- ❖ léčivka
- ❖ možný přímý výsev v IV.
- ❖ snese polostín



Callistephus chinensis - astra čínská

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ velmi široká barevná škála
- ❖ trpí na houbové choroby - *Fusarium*
- ❖ výsev: III.




Dahlia pinnata - jiřinka

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ hlíznatá květina
- ❖ pestrobarevné květy, pěstují se ve směsi
- ❖ barevné listy (purpurové)
- ❖ citlivé na mráz
- ❖ výsev III. – IV.



Celosia argentea - nevadlec

- ❖ č. *Amaranthaceae*
- ❖ teplomilná letnička
- ❖ 2 formy: *cristata* (25 - 30 cm)
plumosa (30 - 50 cm)
- ❖ zářivé barvy květů
- ❖ výsev v III.



Clarkia unguiculata - lokanka

- ❖ č. *Onagraceae*
- ❖ z Kalifornie
- ❖ květy barvy růžové, červené
- ❖ přímý výsev v IV.
- ❖ vlhké počasí nesnáší




Coleus x blumei - koleus

- ❖ č. *Lamiaceae*
- ❖ původem z Afriky – tropická rostlina
- ❖ dekorativní listem
- ❖ letnička citlivá na mráz
- ❖ výsev v III.



Chrysanthemum carinatum - kopretina

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ výška 40 - 80 cm
- ❖ přímý výsev nebo předpěstování v IV.



Chrysanthemum parthenium - kopretina

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ částečně vytrvalá
- ❖ kvete jen měsíc (VII. – VIII.)
- ❖ výsev: III.
- ❖ roste nejlépe v polostínu



Eschscholtzia californica - sluncovka

- ❖ č. *Papaveraceae*
- ❖ nízké rostliny
- ❖ suchá a slunná stanoviště
- ❖ přímý výsev v IV. (křulový kořen)



Euphorbia marginata - pryšec

- ❖ č. *Euphorbiaceae*
- ❖ letnička okrasná listem
- ❖ vysoká rostlina
- ❖ lehčí půda a teplé stanoviště
- ❖ přímý výsev (IV.)
nebo výsev do truhlíku v III.



Gaillardia pulchella - kokarda

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ jednoduchý nebo plný květ
- ❖ syté barvy (v teplých odstínech)
- ❖ výsev v III.



Godetia grandiflora (*Clarkia amoena*) - zářivka

- ❖ č. *Onagraceae*
- ❖ kompaktní rostliny - plošné výsadby
- ❖ jasná barva květů (červená, růžová)
- ❖ výsev v III.




Gypsophilla elegans - šater

- ❖ č. *Caryophyllaceae*
- ❖ vzdušná letnička
- ❖ převážně k řezu
- ❖ nesnáší vlhko
- ❖ přímý výsev v III.



Helenium tenuifolium - záplevák

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ málo pěstovaný druh
- ❖ odolná, bohatě kvetoucí letnička
- ❖ výsev v IV.




Helipterum roseum - smilek

❖ č. *Asteraceae*

❖ k sušení


❖ barva květu: růžová, bílá

❖ výsev v IV.



Lagurus ovatus - zaječí ocásek

- ❖ č. *Poaceae*
- ❖ k řezu a k sušení
- ❖ doplněk barevných letniček
- ❖ výsev v IV.



Limonium sinuatum - limonka

- ❖ č. *Plumbaginaceae*
- ❖ k sušení
- ❖ velmi stará kulturní rostlina
(k sušení se pěstuje již od 16.stol.)
- ❖ výsev v III.



Lonas annua - břinek

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ planý druh roste v Africe (Alžír)
- ❖ k sušení
- ❖ snese suché stanoviště,
nenáročný
- ❖ výsev v III.



Matthiola incana - fiala

- ❖ č. *Brassicaceae*
- ❖ tradiční letnička na záhony i k řezu
- ❖ plnokvěté formy
- ❖ snese nízké teploty - výsadba již v pol. IV.
- ❖ výsev: II.




Mirabilis jalapa - nocenka

- ❖ č. *Nyctaginaceae*
- ❖ solitera (trvalka)
- ❖ pěstuje se ve směsi barev (bílá, růžová, červená, žlutá)
- ❖ choulostivá na nízké teploty
- ❖ výsev: IV.



Nigella damascena - černucha

- ❖ č. *Ranunculaceae*
- ❖ nenáročná letnička
- ❖ okrasná plodenstvím (měchýřky)
- ❖ k sušení
- ❖ kvete krátce
- ❖ přímý výsev: IV.



Pennisetum villosum - vousatec

❖ č. *Poaceae*

❖ k sušení (mladé klásky – rozpadá se)

❖ pozdě vykvétá (červenec)

❖ přímý výsev: IV



Penstemon - dračík

- ❖ č. *Plantaginaceae*
- ❖ vytrvalý - křížením se stává letničkou
- ❖ směs barev
- ❖ kvete velmi dlouho
- ❖ výsev: II.



Phlox drummondii - plamenka

- ❖ č. *Polemoniaceae*
- ❖ velká barevná škála
- ❖ pěstují se ve směsi
- ❖ nenáročná a
přizpůsobivá letnička
- ❖ výsev: II.



Rudbeckia hirta - třapatka

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ vděčná letnička do skupinových záhonů
- ❖ vhodná k řezu
- ❖ kontrastní barva
(střed a okvětní plátky)
- ❖ výsev: III. – IV.



Salpiglossis sinuata - jazylka

- ❖ č. *Solanaceae*
- ❖ pochází z Chile
- ❖ záhonové výsadby
- ❖ menší sortiment barev
- ❖ kvete časněji (končí již v srpnu)
- ❖ výsev: III.



Salvia hormium - šalvěj

- ❖ č. *Lamiaceae*
- ❖ syn. *S. viridis*
- ❖ v různých barvách (bílozelená, růžová, purpurová)
- ❖ okrasný prvek – palisty
- ❖ výsev: III.



Tagetes erecta - aksamitník

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ pochází z tropických oblastí Ameriky
- ❖ vděčná letnička
- ❖ k plošným výsadbám i k řezu
- ❖ výsev: IV.



Tropaeolum majus - lichořeřišnice

- ❖ č. *Tropaeolaceae*
- ❖ 2 růstové formy: plazivá, kompaktní růst
- ❖ na pravidelné výsadby
- ❖ druh *T.peregrinum* je popínavá letnička
- ❖ přímý výsev: IV.



Zinnia elegans - ostálka

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ nízké (20 - 50cm) i vysoké (70 - 90cm) typy
- ❖ na záhony, k řezu (dlouho vydrží ve váze)
- ❖ kvete celé léto
- ❖ výsev: IV.





Vysoké druhy letniček

- ❖ výška: nad 80 cm
- ❖ využití: letničkové záhony, solitery
- ❖ výsadbový spon: 40 - 100 cm
- ❖ + (výhody): velmi výrazné druhy viditelné na dálku, atraktivní
- ❖ - (nevýhody): kvetení není kontinuální, rozložitý až bujný růst, rozklesávání


Amaranthus caudatus - laskavec

- ❖ č: *Amaranthaceae*
- ❖ výška až 1m
- ❖ výsev: IV.
- ❖ soliterní, teplomilná letnička



Dahlia pinnata - jiřinka

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ hlíznatá květina
- ❖ pestrobarevné květy
- ❖ citlivé na mráz



Cleome spinosa - luštěnice

- ❖ č. *Cleomaceae*
- ❖ soliterní letnička
- ❖ nenáročná,
- ❖ výsev: IV.



Cosmos bipinnatus - krásenka

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ vysoká soliterní letnička
- ❖ vzdušná struktura
- ❖ citlivá na mráz
- ❖ pěstuje se také
Cosmos sulphureus (oranžový)
- ❖ výsev v IV.



Helianthus annuus - slunečnice

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ soliterní, robustní letnička
- ❖ odrůdy s 1 či více květy na stonku
- ❖ živná půda
- ❖ přímý výsev
IV. – V.



Helichrysum bracteatum - smil

- ❖ č. *Asteraceae*
- ❖ především k sušení
- ❖ výsev v IV.




Ipomoea purpurea - povijnice

- ❖ č. *Convolvulaceae*
- ❖ popínavá letnička
- ❖ barva květů: bílá, růžová, červená, modrá, fialová
- ❖ výsev v IV.



***Kochia scoparia* (*Bassia scoparia*)** **- letní cypřišek**

- ❖ č. *Amaranthaceae*
- ❖ dekorativní olistěním
- ❖ snáší tvarování
- ❖ přímý výsev v IV.



Lathyrus odoratus - hrachor

- ❖ č. *Fabaceae*
- ❖ pochází ze Sicílie
- ❖ pnoucí letnička
- ❖ barva květu: bílá, růžová, červená, fialově-modrá
- ❖ přímý výsev v III.



Lavatera trimestris - slézovec

- ❖ č. *Malvaceae*
- ❖ nepříliš častá letnička
- ❖ solitera – bujně roste
- ❖ přímý výsev v IV.



Phaseolus coccineus - fazol

- ❖ č. *Fabaceae*
- ❖ pnoucí letnička
- ❖ vhodná i do nádob
- ❖ přímý výsev: V.

